



Sede Legale: Viale Mazzini n. 4
25032 Chiari (Brescia)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982

Servizio di Medicina di Laboratorio Aziendale (S.Me.L)

Direttore f.f. Dr.ssa Maria Teresa Bertoli

P.O. Chiari -Tel. 030 7102263 Fax 030 7102334 e-mail: laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it

P.O. Iseo - Tel. 0309887220 Fax 030 9887353 e-mail: laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it

INTRADERMOREAZIONE ALLA TUBERCOLINA

- La sensibilizzazione al *Micobacterium tuberculosis* viene saggiata mediante intradermoreazione alla tubercolina che viene effettuata con iniezione intradermica sul lato volare dell'avambraccio di un derivato proteico purificato della tubercolina, alla dose di 5 UI.
- Il paziente non deve essere a digiuno per l'esecuzione di questo test.
- E' richiesta la compilazione di apposito modulo di consenso informato.

Valutazione del risultato

- Il paziente deve ritornare dopo 72 ore per la valutazione della intradermoreazione, che è di tipo ritardato.
- Qualora l'intervallo di 72 ore si concluda in un giorno festivo la valutazione può essere anticipata a 48 ore.
- La intradermoreazione tubercolinica viene considerata positiva qualora si rilevi la presenza di un pomfo del diametro minimo di 6 mm (soglia di reattività).

Nota

Si segnala che in alternativa all'intradermoreazione può essere richiesto il test diagnostico per il dosaggio dell'Interferone – gamma, denominato **TEST IGRA (QUANTIFERON)** che consente di identificare in vitro la risposta immunitaria a Mycobacterium tuberculosis complex.

Per l'esecuzione ci si deve sottoporre a prelievo ematico e non è necessario ritornare in ambulatorio.