



Servizio di Medicina di Laboratorio Aziendale (S.Me.L)

Direttore f.f. Dr.ssa Maria Teresa Bertoli
P.O. Chiari - Tel. 030 7102263 Fax 030 7102334 e-mail: laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it
P.O. Iseo - Tel. 0309887220 Fax 030 9887353 e-mail: laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it

TEST AL LATTOSIO

Il test è utilizzato per rilevare l'intolleranza al lattosio.

Per l'esecuzione del test il paziente si deve presentare a digiuno, possibilmente non oltre le ore 8.30 ed è prevista la possibilità di accedere alla corsia preferenziale di accettazione del Laboratorio, indipendentemente dall'ordine di arrivo, perché è necessario che il paziente si trattienga in Laboratorio per almeno un'ora dopo la somministrazione del lattosio.

Viene eseguito un prelievo di base per la determinazione della glicemia basale e successivamente somministrato nell'**adulto** 50 g di lattosio sciolto in 100 mL di acqua e nel **bambino** fino a 30 kg 1,75 g di lattosio per kg di peso corporeo sciolto in 50 mL di acqua.

Il paziente è invitato a sostare nella sala d'attesa.

Viene poi eseguito un secondo prelievo dopo 60 minuti dalla somministrazione del lattosio per la determinazione della glicemia.

Nel caso di intolleranza al lattosio è possibile la comparsa di blanda sintomatologia dolorosa addominale.