



### Servizio di Medicina di Laboratorio Aziendale (S.Me.L)

Direttore f.f. Dr.ssa Maria Teresa Bertoli  
P.O. Chiari - Tel. 030 7102263 Fax 030 7102334 e-mail: [laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it](mailto:laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it)  
P.O. Iseo - Tel. 0309887220 Fax 030 9887353 e-mail: [laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it](mailto:laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it)

## UROPORFIRINE/COPROPORFIRINE URINARIE

### **MATERIALE PER LA RACCOLTA**

Contenitore in plastica per le urine delle 24 ore oppure altro contenitore graduato ben lavato dal quale sia possibile desumere l'entità della diuresi (quantità di urine emesse nelle 24 ore).

Il contenitore deve essere ricoperto con carta scura (o con foglio di alluminio) per mantenere al buio il contenuto.

### **MODALITA' DI RACCOLTA**

All'inizio della raccolta eliminare le prime urine del mattino. Poi, per tutte le 24 ore successive, raccogliere tutte le urine, compresa l'ultima emessa il mattino seguente nell'apposito contenitore.

Esempio:

- il 1° giorno alle ore 8 urinare e gettare l'urina
- fino alle ore 8 del 2° giorno raccogliere tutta l'urina nell'apposito contenitore
- il 2° giorno alle ore 8 urinare ed aggiungere l'urina a quella già conservata.

**Durante il periodo di raccolta conservare il contenitore con l'urina in frigorifero o in luogo fresco, al riparo dalle radiazioni solari e luminose.**

Consegnare tutta l'urina raccolta per la misura del volume totale. Qualora al paziente sia più pratico e comodo, al Laboratorio può consegnare una o più provette (secondo gli esami richiesti) riempite con urina delle 24 ore, indicando al momento dell'accettazione del materiale la quantità delle urine emesse nelle 24 ore (diuresi).

NOTA: nel caso in cui si debba eseguire anche l'analisi completa delle urine e/o l'esame colturale, il mattino della consegna eseguire la raccolta dei rispettivi campioni: all'ultima minzione (nell'esempio alle ore 8 del 2° giorno) raccogliere il primo mitto (getto) nella provetta (per l'esame completo) ed il mitto (getto) intermedio nel contenitore sterile (per l'esame colturale); il resto dell'urina emessa va aggiunta a quella raccolta nelle 24 ore precedenti.